

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Ce médicament ne doit pas être utilisé avec certains médicaments (cf. Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament).

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson sauf lévodopa et certains médicaments donnant des torsades de pointes (troubles graves du rythme cardiaque) : les antiarythmiques de classe Ia (quinidine, hydroquinidine, disopyramide), les antiarythmiques de classe III (amiodarone, sotalol, dofetilide, ibutilide), certains neuroleptiques (thioridazine, chlorpromazine, lévomépromazine, trifluopérazine, amisulpride, sulpiride, tiapride, pimozide, halopéridol, dropéridol) et autres médicaments tels que : bédridil, cisapride, diphémanil, érythromycine IV, mizolastine, vincamine IV, halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, moxifloxacine, spiramycine IV..., IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Allaitement

L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement par ce médicament.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Amidon de blé (gluten).
Lactose.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

La posologie est variable et doit être adaptée à chaque cas.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de prise d'une dose excessive de médicament, prévenir immédiatement un médecin ou un service d'urgence en raison du risque de survenue de troubles cardiaques graves.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- sensation de vertiges lors du passage brusque de la position couchée ou assise à debout,
- sécheresse de la bouche, difficultés pour uriner, constipation voire occlusion intestinale (cf. Mises en garde spéciales),

Tercian® 25 mg
Tercian® 100 mg

cyamémazine

comprimé pelliculé sécable

comprimé pelliculé sécable

sanofi aventis

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Composition

Tercian 25 mg :

Tartrate de cyamémazine 36,60 mg
quantité correspondant à cyamémazine base 25,00 mg
pour un comprimé pelliculé sécable.

Tercian 100 mg :

Tartrate de cyamémazine 146,40 mg
quantité correspondant à cyamémazine base 100,00 mg
pour un comprimé pelliculé sécable.

Excipients (communs) : lactose, amidon de blé, silice colloïdale hydratée, acide alginique, talc, stéarate de magnésium. Pelliculage : hypromellose, macrogol 6000, dioxyde de titane (E171), bleu patenté V (E131).

Forme pharmaceutique et présentations

Comprimé pelliculé sécable.

Tercian 25 mg (boîte de 30).

Tercian 100 mg (boîte de 25).

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPSYCHOTIQUE

Nom et adresse de l'exploitant

sanofi-aventis france

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris - France

Information médicale : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Nom et adresse du fabricant

Aventis Intercontinental

56, route de Choisy au Bac

60205 Compiègne - France

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certains troubles du comportement et dans le traitement de certaines formes d'anxiété chez l'adulte.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS être utilisé dans les cas suivants :

- allergie connue à la cyamémazine ou à l'un des constituants du comprimé,
- risque de glaucome (pression anormalement élevée à l'intérieur de l'œil),
- difficulté à uriner d'origine prostatique ou autres,
- antécédent d'agranulocytose (chute importante du nombre de certains globules blancs (granulocytes) dans le sang),
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten),
- en association avec :
 - . le sultopride,
 - . les agonistes dopaminergiques sauf lévodopa (amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline, entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, quinagolide, ropinirole) en dehors du cas du patient parkinsonien.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

En cas d'apparition de fièvre accompagnée ou non de signes d'infection (angine...), de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- La survenue d'une rigidité musculaire et de troubles de la conscience, accompagnés d'une fièvre inexpliquée au cours du traitement impose l'arrêt immédiat de la prise du médicament et la consultation en urgence du médecin.
- Afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. Ce médicament peut en effet, dans de très rares cas, provoquer des troubles du rythme cardiaque potentiellement fatals (cf. Effets non souhaités et gênants).
- En cas de constipation persistante, de ballonnement important et de douleurs abdominales, consultez rapidement un médecin. Ce médicament peut en effet, dans de très rares cas, provoquer une occlusion intestinale. Ce médicament peut également, dans de très rares cas, provoquer une inflammation très grave de l'intestin, pouvant aller jusqu'à la nécrose.
- Chez l'enfant, un suivi médical régulier est indispensable.
- La prise de comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

Prévenez votre médecin en cas de :

- maladie cardiaque,
- maladie du foie ou des reins,
- antécédents de convulsions (anciennes ou récentes), épilepsie,
- augmentation de la taille de la prostate,
- constipation.

La prise de boissons alcoolisées est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- troubles visuels dont des troubles de l'accommodation (aptitude de l'œil à s'adapter pour voir de près ou de loin),
- confusion,
- somnolence, anxiété, troubles de l'humeur,
- tremblements, rigidité et/ou mouvements anormaux,
- impuissance, frigidité,
- prise de poids,
- absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement de lait par le mamelon en dehors des périodes normales d'allaitement,
- modification du taux de sucre dans le sang.

Rarement peuvent survenir :

- troubles du rythme cardiaque pouvant exceptionnellement entraîner un décès (cf. Mises en garde spéciales),
- allergie cutanée, réaction cutanée exagérée au soleil ou aux rayonnements ultraviolets,
- jaunisse, hépatite.

Plus rarement peuvent survenir :

- fièvre, forte transpiration, pâleur : la survenue d'un de ces signes nécessite d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence,
- inflammation très grave de l'intestin, pouvant aller jusqu'à la nécrose,
- crises convulsives, principalement en cas d'antécédents d'épilepsie ou en présence d'autres facteurs de risque, comme l'association à d'autres médicaments abaissant le seuil épileptogène ou l'alcoolisme.

Et exceptionnellement peuvent survenir :

- chute importante du nombre de certains globules blancs (granulocytes) dans le sang,
- érection douloureuse et prolongée.

N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT, EN PARTICULIER CEUX QUI NE SERAIENT PAS MENTIONNES DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation

A conserver à une température inférieure à 30 °C et à l'abri de la lumière.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2007.



Pour toute demande de notice en braille, contacter notre département d'information médicale et scientifique au N° vert 0800 222 555 ou au +33 1 57 63 23 23 (appel depuis l'étranger).