

Kayexalate®

Polystyrène sulfonate de sodium



sanofi aventis

Poudre pour suspension orale et rectale
Boîte de 454 g avec cuillère-mesure de 15 g.

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition : Polystyrène sulfonate de sodium : 453,70036 g. Excipients : vanilline, saccharine q.s.p. une boîte de 454 g.

Forme pharmaceutique : Poudre pour suspension orale et rectale. Boîte contenant 30 cuillères-mesure.

Classe pharmaco-thérapeutique : MEDICAMENT DE L'HYPERKALIEMIE ET DE L'HYPERPHOSPHATEMIE.

Exploitant : Sanofi-aventis france

1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - FRANCE

Information médicale : N° vert 0 800 222 555 - Appel depuis l'étranger : + 33 1 57 63 23 23

Fabricant : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

196, avenue du Maréchal Juin - 45200 Amilly - FRANCE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hyperkaliémie (*excès de potassium dans le sang*).

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament : Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants : • kaliémie (taux de potassium dans le sang) inférieure à 5 mmol/l, • antécédent d'allergie aux résines de polystyrène sulfonate, • maladie intestinale

obstructive (pour une utilisation de ce médicament par voie orale), • administration par voie orale chez le nouveau-né, • administration (par voie orale et rectale) chez le nouveau-né présentant une diminution de la motricité intestinale (post-opératoire ou d'origine médicamenteuse). Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin, en association avec le sorbitol.

Précautions d'emploi : • Ce traitement nécessite une surveillance biologique particulière (avec prise de sang). • Enfants et nouveau-nés : Risque de saignement digestif ou d'atteinte du côlon (nécrose colique) chez les prématurés et les nouveau-nés de petit poids.

• Ce médicament contient 345 mg de sodium par mesurette : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, strict.

Interactions médicamenteuses et autres interactions : AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment le sorbitol, les médicaments pour traiter la thyroïde et les traitements gastriques, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement : Aucune donnée n'est disponible sur l'utilisation de la résine pendant la grossesse ni l'allaitement. Cependant, le polystyrène sulfonate de sodium n'étant pas absorbé/résorbé, ce médicament peut être prescrit au cours de la grossesse ou de l'allaitement, si nécessaire. D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS PREVENIR VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients : Sodium.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie : La quantité de KAYEXALATE à administrer est en rapport direct avec le taux de potassium sanguin ; elle est donc à adapter à chaque malade.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Mode et voie d'administration : • Voie orale : la poudre est administrée après mise en suspension dans un peu d'eau. L'adjonction éventuelle de sucre vanillé ou de sirop doit être laissée à l'appréciation de chaque patient. La mise en suspension dans un jus de fruit est à proscrire en raison de la teneur élevée en potassium. • Voie rectale.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré : SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Conduite à tenir en cas de surdosage : Un surdosage peut provoquer une hypokaliémie qui sera traitée comme telle.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : • hypokaliémie (taux anormalement bas de potassium dans le sang), hypocalcémie (taux anormalement bas de calcium dans le sang), rétention hydro-sodée (eau et sel), hypomagnésémie (taux anormalement bas de magnésium dans le sang), • constipation, • troubles digestifs mineurs après administration orale (irritation gastrique, nausées, vomissements, perte de l'appétit, parfois diarrhées). Ont également été rapportés de façon exceptionnelle : • fécalome (bouchon de matières fécales) après administration rectale, en particulier chez les enfants, • concrétions gastro-intestinales après administration orale, • occlusion intestinale (notamment en cas de pathologie intercurrente ou de dilution inadéquate de la résine), • ulcération gastro-intestinale, nécrose gastro-intestinale, voire perforation intestinale, • bronchite aiguë et/ou broncho-pneumonie après inhalation de particules de polystyrène sulfonate.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Tenir à l'abri de l'humidité.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Novembre 2005.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE - LISTE II

Médicament autorisé n° 323 508.6

* 3 2 3 5 0 8 6 *

H Z B L F M *

780 x 250 mm

HZBLFM

80 x 250 mm