



Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Consulter un médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Possibilité de troubles digestifs, bouche sèche, vertiges, maux de tête, augmentation du rythme cardiaque, fatigue, sensation de malaise.
 - Des cas de réactions allergiques ont été décrits à type d'urticaire (rarement), d'œdème de Quincke (gonflement du visage et du cou) ou de choc anaphylactique (exceptionnellement).
 - Exceptionnellement des cas de crises oculogyres et d'érythèmes pigmentés fixes ont été décrits.
 - Possibilité de somnolence, chez certains sujets sensibles, apparaissant dès le début du traitement.
 - Possibilité d'agitation particulièrement chez l'enfant.
 - Modification du bilan hépatique réversible à l'arrêt du traitement.
- SIGNALIZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Août 2006.

Pour toute demande de notice en braille, contacter notre département d'information médicale et scientifique au N° vert 0800 222 555 ou au +33 1 57 63 23 23 (appel depuis l'étranger).

Virlix® 10 mg

dichlorhydrate de cétirizine

comprimés pelliculés sécables

sanofi aventis

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Dichlorhydrate de cétirizine 10 mg

Excipients : Amidon de maïs, lactose, povidone, stéarate de magnésium, méthocel E premium, dioxyde de titane, macrogol 400, talc, q.s.p. un comprimé pelliculé sécable.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé pelliculé sécable. (Boîte de 15).

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIHISTAMINIQUE H1

Exploitant

sanofi-aventis france

1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

Information médicale : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

6, boulevard de l'Europe - 21800 Quetigny - France

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un antihistaminique (il s'oppose aux effets de certaines substances telles que l'histamine libérées dans l'organisme au cours de l'allergie).
Il est préconisé :

Chez l'adulte pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex : rhume des foins) ou perannuelle,
- de l'urticaire,
- des conjonctivites d'origine allergique.

Chez l'enfant pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex : rhume des foins) ou perannuelle,
- de l'urticaire.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des composants du comprimé ; à l'hydroxyzine, à la lévocétirizine ou à l'éthylène diamine,
- insuffisance rénale,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (en raison du risque de fausse route chez les petits enfants ayant des difficultés à avaler les comprimés).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose, ce médicament n'est pas recommandé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

La cétirizine doit être administrée avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.

Précautions particulières d'emploi

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Conducteurs et utilisateurs de machines

Chez certains patients, la cétirizine peut provoquer une somnolence. Cet effet est rare si la dose préconisée de 1 comprimé par jour est respectée. Néanmoins, il est recommandé de s'assurer de l'absence de cet effet lors des premières prises avant de conduire ou d'utiliser des machines dangereuses.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Lactose.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans :

- 1 comprimé 1 fois par jour.

Chez l'enfant de 6 à 12 ans :

- 1 comprimé 1 fois par jour ou
- 1/2 comprimé 2 fois par jour.