

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

Comprimé effervescent sécable

sanofi aventis

Veillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.
Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser **DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable** avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable

Liste complète des substances actives et des excipients

La substance active est : paracétamol 1000 mg, pour un comprimé effervescent sécable.

Les autres composants sont : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, laurilsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange.

Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

TITULAIRE/EXPLOITANT

THÉRAPLIX 46, quai de la Rapée - 75590 Paris cedex 12

FABRICANT

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1 - D-50829 Cologne - Allemagne

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Forme pharmaceutique et contenu ; classe pharmacothérapeutique.

Ce médicament est un antalgique, antipyrétique. Ce médicament se présente sous forme de comprimés effervescents sécables en boîte de 8 comprimés.

Indications thérapeutiques. Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose. Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans). **Lire attentivement la rubrique " COMMENT PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable " ? Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.**

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable ?

Contre-indications. Ne prenez jamais DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol ou autres constituants du comprimé, maladie grave du foie, enfants de moins de 15 ans.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales.

Prendre des précautions particulières avec DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable :

► **Précautions particulières**

- Si la douleur persiste **plus de 5 jours** ou la fièvre **plus de 3 jours**, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.
- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.

► **Mises en garde**

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre " COMMENT PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable ?").

► **Grossesse et allaitement**

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'au cours de l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable. Ce médicament contient du sel (sodium).

► **Interactions avec d'autres médicaments**

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang. Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMMENT PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable ?

Instructions pour un bon usage. Attention : cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par comprimé : **ne pas prendre 2 comprimés à la fois.**

Posologie. En raison de son dosage, **ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant dont le poids est supérieur à 50 kg** (à partir d'environ 15 ans). La posologie usuelle est de **1/2 à 1 comprimé à 1000 mg** par prise, à renouveler au bout de **6 à 8 heures**. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum. Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3000 mg de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

Dependant en cas de douleurs plus intenses, et sur avis de votre médecin, la dose totale peut être augmentée jusqu'à 4000 mg de paracétamol par jour, soit 4 comprimés par jour.

Dependant :

- Les doses supérieures à 3000 mg de paracétamol par jour nécessitent un avis médical.
- **NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES (4000 mg) DE PARACÉTAMOL PAR JOUR** (en tenant compte de tous les autres médicaments pris et contenant du paracétamol dans leur formule).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour (3000 mg).

Si vous avez l'impression que l'effet de Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode et voie d'administration : VOIE ORALE.

Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau ; boire immédiatement après.

Fréquence d'administration. Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre : elles doivent être espacées de 4 heures minimum.

Symptômes et instructions en cas de surdosage. Si vous avez pris plus de **DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable** que vous n'auriez dû : en cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin.

Instruction en cas d'omission d'une ou plusieurs doses. Si vous oubliez de prendre **DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable** : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments **DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable** est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol ;
- Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé effervescent sécable ?

Conserver le conditionnement primaire soigneusement fermé et à l'abri de l'humidité.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne laisser ni à la vue ni à la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : avril 2005.

THÉRAPLIX participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Nous vous demandons en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non.

