

Xatral[®] 25 mg

comprimé pelliculé
sanofi aventis

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Chlorhydrate d'alfuzosine 2,5 mg
Excipients : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, povidone, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane q.s.p. un comprimé pelliculé.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé pelliculé. (Boîte de 30).

Classe pharmaco-thérapeutique

ALPHA-BLOQUANTS

Exploitant

Sanofi-aventis france
1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France
Information médicale : N° vert 0800 222 555
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
30/36, avenue Gustave Eiffel - 37100 Tours - France

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament appartient à la classe des alpha-bloquants.

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles de l'hypertrophie (augmentation de volume) bénigne de la prostate.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue à l'alfuzosine et/ou à l'un des autres composants de ce médicament,

- hypotension orthostatique (sensation de vertige survenant le plus souvent lors d'un passage de la position allongée à la position debout),
- insuffisance hépatique sévère (défaillance des fonctions du foie),
- insuffisance rénale sévère.

Mises en garde spéciales

Certains sujets peuvent présenter une susceptibilité particulière à XATRAL 2,5 mg qui se traduit par une baisse de la pression artérielle en passant de la position couchée à la position debout. Ce phénomène peut apparaître dans les heures suivant la prise du médicament et être accompagné des symptômes suivants : vertiges, fatigue, sueurs. Le sujet doit être placé en position allongée jusqu'à disparition complète de ces manifestations qui sont transitoires.

La prudence est recommandée en particulier chez les sujets âgés et chez les sujets ayant eu une baisse importante de la pression artérielle avec un médicament de la même classe (alpha-bloquant).

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

Prévenir votre médecin en cas de maladie de cœur (en particulier, insuffisance coronarienne).

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, et notamment avec certains médicaments pour la tension ou certains antifongiques

VX332S

(kétoconazole, itraconazole), du ritonavir, ou certains antibiotiques (clarithromycine, érythromycine), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne concerne pas la femme. D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS PREVENIR VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'attention est attirée chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les risques d'hypotension orthostatique (chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges), de sensations vertigineuses, de sensation de fatigue ou de troubles visuels, surtout en début de traitement.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Lactose monohydraté.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

La posologie usuelle est de un comprimé trois fois par jour.

Chez les sujets âgés ou traités pour une hypotension ou ayant une insuffisance hépatique, cette posologie peut être modifiée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Le comprimé doit être avalé entier avec un verre d'eau.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

Selon prescription médicale.

Durée du traitement

Ne pas interrompre le traitement sans avis médical.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Contactez votre médecin.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Ne prenez pas deux ou plusieurs comprimés en même temps, mais prenez normalement le comprimé suivant.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINDER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Fréquemment :

- étourdissements, sensations vertigineuses, vertiges, malaise, chute de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position debout, maux de tête,
- troubles digestifs à type de nausées, maux d'estomac ou diarrhée, bouche sèche,
- sensation de fatigue.

Peu fréquemment :

- somnolence,
- troubles de la vision,
- accélération du rythme cardiaque, palpitations, syncope,
- congestion nasale,
- manifestations cutanées à type d'éruptions cutanées ou de démangeaisons,
- rougeurs du visage, œdèmes, douleurs thoraciques.

Très rarement :

- angine de poitrine chez les patients ayant des antécédents de troubles coronariens, (cf. rubrique Précautions d'emploi)
- urticaire, œdème angio-neurotique.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

Conservation

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Précautions particulières de conservation

Conservé les plaquettes thermoformées dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Date de révision de la notice

Février 2006.

Pour toute demande de notice en braille, contacter notre département d'information médicale et scientifique au N° vert 0800 222 555 ou au +33 1 57 63 23 23 (appel depuis l'étranger).

VX3325

