

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de prise d'une dose excessive de médicament, prévenir immédiatement un médecin ou un service d'urgence notamment en raison du risque de survenue de troubles cardiaques graves.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Ne doublez pas la dose.
Si vous oubliez plusieurs doses ou si l'oubli d'une dose se reproduit, vous devez en informer votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang, hormone provoquant la lactation) réversible après l'arrêt du traitement et signes associés : absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement anormal de lait par le mamelon, impuissance, frigidité,
 - prise de poids,
 - somnolence, insomnie, fatigue,
 - indifférence,
 - agitation,
 - céphalées,
 - tremblements, rigidité et/ou mouvements anormaux dont ceux du visage (incluant la langue), hypersalivation,
 - sensation de vertiges en particulier lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout,
 - troubles du rythme cardiaque,
 - exceptionnellement : fièvre inexplicquée, sudation, pâleur, modification de la tension artérielle, altération de la conscience, rigidité musculaire (cf. Mises en garde spéciales).
- N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT, EN PARTICULIER CEUX QUI NE SERAIENT PAS MENTIONNES DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Précautions particulières de conservation

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2006.

Tiapridal® 100 mg

tiapride

comprimé sécable

sanofi aventis

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Tiapride chlorhydrate 111,1 mg
Quantité correspondant à tiapride base 100,0 mg

Excipients : mannitol, cellulose microcristalline, povidone, silice colloïdale hydratée, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé sécable.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé sécable. (Boîte de 150).

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPSYCHOTIQUE

Exploitant

sanofi-aventis france - 1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

Information médicale : N° vert 0800 222 555 - Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - 6, boulevard de l'Europe - 21800 Quétigny - France

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certains troubles du comportement et dans le traitement de certaines douleurs rebelles intenses.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie au tiapride ou à l'un des constituants du comprimé,
- tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple tumeur de l'hypophyse ou cancer du sein dépendant de la prolactine,
- phéochromocytome (atteinte de la glande médullosurrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),



- en association avec certains médicaments agissant sur le système nerveux central : sultopride, cabergoline, pramipexole, quinafolide.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

En cas d'apparition de fièvre inexpliquée, de pâleur ou de forte transpiration, il est indispensable d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

Au cours du traitement, en cas d'apparition de fièvre inexpliquée, de pâleur, de forte transpiration, de rigidité musculaire ou de troubles de la conscience, la vie du patient pouvant être mise en jeu, il est indispensable d'arrêter le traitement et de consulter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

Afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme.

Chez l'enfant, un suivi médical régulier est indispensable.

La prise de comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.

La prise concomitante du tiapride est à éviter avec certains médicaments pour le cœur (quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, dofétilide, ibutilide, bépridil), certains médicaments agissant sur le système nerveux central (thioridazine, chlorpromazine, lévomépromazine, cyamémazine, amisulpride, sulpiride, halopéridol, dropréridol, pimozide, vincamine IV), certains antibiotiques (érythromycine IV, moxifloxacine, spiramycine IV), certains anti-parasitaires (pentamidine, halofantrine, luméfántrine), certains anti-allergiques (mizolastine), le cisapride (un médicament anti-reflux), le diphémanil (un anti-spasmodique), certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lévodopa, lisuride, pergolide, priribédil, ropinirole, sélégitine), avec la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

Précautions d'emploi

Afin que votre médecin puisse adapter la posologie et/ou la surveillance de votre traitement, il est nécessaire de le prévenir en cas de :

- maladie cardiaque,
- maladie de Parkinson,
- insuffisance rénale.

- antécédents de convulsions (anciennes ou récentes), épilepsie.

Ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les personnes âgées, plus sensibles au risque de somnolence et d'hypotension (par exemple une sensation de vertige survenant le plus souvent lors d'un passage de la position allongée à la position debout).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Ce médicament ne doit pas être utilisé avec le sultopride, la cabergoline, le pramipexole, la quinafolide.

Ce médicament est à éviter avec certains médicaments pour le cœur (quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, dofétilide, ibutilide, bépridil), certains médicaments agissant sur le système nerveux central (thioridazine, chlorpromazine, lévomépromazine, cyamémazine, amisulpride, sulpiride, halopéridol, dropréridol, pimozide, vincamine IV), certains antibiotiques (érythromycine IV, moxifloxacine, spiramycine IV), certains anti-parasitaires (pentamidine, halofantrine, luméfántrine), certains anti-allergiques (mizolastine), le cisapride (un médicament anti-reflux), le diphémanil (un anti-spasmodique), certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lévodopa, lisuride, pergolide, priribédil, ropinirole, sélégitine), avec la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse-Allaitement

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Allaitement

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

Réserve à l'adulte et à l'enfant à partir de 6 ans.

La posologie est variable et doit être adaptée à chaque cas.

DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.