

NOTICE

MAXILASE® 3000 U. CEIP Comprimé enrobé
alpha-amylase



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Alpha-amylase 3 000 U. CEIP*

Excipients : carmellose calcique, povidone, acide stéarique, silice colloïdale anhydre, lactoglobuline, lactose, gomme laque décolorée blanchie, gomme arabique, saccharose, talc, dioxyde de titane (E 171), jaune orangé S (E 110), cire d'abeille blanche pour un comprimé enrobé.

* soit 2 143 Unités Pharmacopée Européenne par comprimé.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimés enrobés (Boîte de 30).

Classe pharmaco-thérapeutique

ENZYMES A VISEE ANTI-INFLAMMATOIRE

(R : Système Respiratoire)

Exploitant

sanofi-aventis france

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris – France

Information médicale : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès et Lagrave

33565 Carbon Blanc Cedex – France

ou

SOFARIMEX

Av. Das Industrias

Alto de Colaride

Agualva

2735 CACEM – Portugal

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans le cas suivant : antécédents d'allergie à l'alpha-amylase ou à l'un des composants du comprimé.

Mises en garde spéciales

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Il existe une forme sirop plus adaptée à l'enfant.

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments...) : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Jaune orangé S (E 110), saccharose.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

Il existe une forme sirop plus adaptée à l'enfant.

1 comprimé 3 fois par jour au cours des repas.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- . IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- . NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

Mode et voie d'administration

Avaler les comprimés, sans les croquer, avec un verre d'eau.

Voie orale.

Durée du traitement

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, MAXILASE® 3 000 U. CEIP, comprimé enrobé, est susceptible d'avoir des effets indésirables.

En raison de la présence d'alpha-amylase et de Jaune orangé S (E 110), rares réactions d'allure allergique, généralement cutanées, en particulier urticaire et œdème de Quincke, dans ce cas, arrêter le traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Précautions particulières de conservation

A conserver à une température inférieure à 25°C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Avril 2007.