

# PYOSTACINE® 250 mg

pristinamycine

Comprimé pelliculé

sanofi aventis

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Composition

Pristinamycine (à 8 000 U/mg) ..... 250 mg pour un comprimé pelliculé

Excipients : silice colloïdale hydratée, dextrine blanche, gélatine, stéarate de magnésium, amidon de blé, hypromellose, macrogol 6000, dioxyde de titane .

### Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé - boîte de 16.

### Classe pharmacothérapeutique

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTÉRIENS de la famille des streptogramines (synergistines).

### Nom et adresse de l'exploitant

sanofi-aventis france  
1-13, boulevard Romain Rolland  
75014 Paris - France  
Information médicale : N° vert 0 800 222 555  
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

### Nom et adresse du fabricant

Famar Lyon  
29, avenue du Général de Gaulle  
69230 Saint Genis Laval - France

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans les infections dues aux germes sensibles à la pristinamycine.

En cas d'allergie aux antibiotiques de la classe des bêta-lactamines, ce médicament est indiqué pour prévenir les complications infectieuses lors des soins dentaires ou d'actes portant sur les voies respiratoires supérieures.

## ATTENTION !

### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ :

- en cas d'allergie à la pristinamycine ou à la virginiamycine,
- en cas d'antécédent d'éruption pustuleuse avec la pristinamycine,
- en cas d'intolérance au gluten ou d'allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten),

- en cas d'allaitement (cf. Grossesse et allaitement).

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### Mises en garde spéciales

La prise concomitante de pristinamycine avec la colchicine (un médicament utilisé pour le traitement de la goutte) est déconseillée (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

### Précautions d'emploi

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN*

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

Ce médicament est déconseillé avec la colchicine (un médicament utilisé pour le traitement de la goutte).

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATI-QUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

### Grossesse - Allaitement

#### Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

*DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.*

#### Allaitement

L'administration de ce médicament fait contre-indiquer l'allaitement.

*DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.*

### Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Amidon de blé (gluten).

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

### Posologie

La posologie dépend de l'âge du patient et de l'infection traitée.

*SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.*

### Mode et voie d'administration

Voie orale.

Pour l'administration aux nourrissons, écraser la dose utile dans un peu de lait ou dans un excipient sucré (confiture).

### Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

La dose quotidienne de pristinamycine doit être régulièrement espacée dans les 24 heures, et être prise de préférence au milieu des repas.

### Durée du traitement

*SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.*

## EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

*COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.*

- Diarrhée (avec douleur de l'abdomen) et possibilité de pesanteur gastrique.  
De très rares cas de vomissement ont été rapportés.
- Manifestations allergiques, notamment urticaire (éruption cutanée identique à celle provoquée par la piqûre d'ortie), œdème de Quincke (brusque infiltration de liquide au niveau de la face ou des muqueuses) et choc anaphylactique (pâleur, angoisse et refroidissement),
- Eruption cutanée pouvant être accompagnée de fièvre, de survenue brutale, débutant au visage ou aux plis et pouvant se généraliser.
- Très rarement : pétéchies (petites taches rouges sur la peau) et décollement cutané bulleux pouvant s'aggraver et s'étendre rapidement à tout le corps et les muqueuses.

*CONSULTEZ VOTRE MEDECIN TRAITANT DES LA SURVENUE DE MANIFESTATIONS ALLERGIQUES ET CUTANÉES ET SIGNALEZ TOUT AUTRE EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.*

## CONSERVATION

**NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.**

### Précautions particulières de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

## CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

### Que savoir sur les antibiotiques

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

**En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

- 1) **N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.**
- 2) **Respectez strictement votre ordonnance.**
- 3) **Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.**
- 4) **Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.**
- 5) **Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.**

## DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Décembre 2005.

Pour toute demande de notice en braille, contacter notre département d'information médicale et scientifique au N° vert 0800 222 555 ou au +33 1 57 63 23 23 (appel depuis l'étranger).