

Ce traitement doit être suivi très régulièrement.

NE JAMAIS INTERROMPRE BRUTALEMENT LE TRAITEMENT SANS AVIS DE VOTRE MEDECIN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en association avec certains médicaments (cf. Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec la floctafénine, le sultopride, l'amiodarone, le bépridil, le diltiazem et le vérapamil, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE – ALLAITEMENT

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, dans la mesure où certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter d'allaiter pendant le traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SPORTIFS

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

La posologie est variable en fonction de l'affection traitée, elle est aussi adaptée à chaque patient.

Habituellement, 1 comprimé par jour. La posologie peut être augmentée en fonction de la réponse thérapeutique.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Ce médicament doit être administré de préférence le matin, avant le petit-déjeuner. Les comprimés doivent être avalés avec une boisson.

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Un comprimé par jour.

DUREE DU TRAITEMENT

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière.

SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de prise d'une dose excessive, appelez immédiatement votre médecin.

CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE

Contactez votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Les plus fréquemment rapportés sont :

- fatigabilité,
- refroidissement des extrémités,
- troubles gastro-intestinaux,
- impuissance.

Beaucoup plus rarement :

- ralentissement important du cœur,
- ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire ou intensification d'un bloc auriculo-ventriculaire existant,
- insuffisance cardiaque,
- chute de tension,
- crise d'asthme,
- hypoglycémie (*quantité insuffisante de sucre dans le sang*),
- syndrome de Raynaud (*troubles circulatoires symétriques des doigts souvent déclenchés par le froid*),
- aggravation d'une claudication (*difficulté à marcher*) intermittente existante,
- diverses manifestations cutanées, notamment des éruptions ressemblant au psoriasis.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

mars 2006.

Pour toute demande de notice en braille, contacter notre département d'information médicale et scientifique au N° vert 0 800 222 555 ou au +33 1 57 63 23 23 (appel depuis l'étranger).

Célectol® 200 mg

céliprolol

Comprimé pelliculé

sanofi aventis

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Chlorhydrate de céliprolol 200 mg pour un comprimé pelliculé.

Excipients : mannitol, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400 et 6000, dioxyde de titane.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS

Comprimé pelliculé. Boîtes de 28 et de 84 comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

BETA-BLOQUANT/SELECTIF

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

sanofi-aventis france

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris - FRANCE

Information médicale : N° vert 0 800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Aventis Intercontinental

56, route de Choisy au Bac

60205 Compiègne - FRANCE

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un « bêta-bloquant ». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire. Il est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle et la prévention des crises douloureuses d'angine de poitrine.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (*défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement*),
- choc cardiogénique (*choc d'origine cardiaque*),
- blocs auriculo-ventriculaires des second et troisième degrés non appareillés (*certain*

cas de troubles de la conduction cardiaque),
- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (*variété de crises d'angine de poitrine*),

- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),

- bradycardie importante (<45-50 battements par minute) (*ralentissement du rythme cardiaque*),

- phéochromocytome non traité (*excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère*),

- hypotension (*diminution de la pression artérielle*),

- hypersensibilité au céliprolol,

- antécédent de réaction anaphylactique (*antécédent de réaction allergique*),

- association à la floctafénine (*médicament de la douleur*), et au sultopride (*médicament du système nerveux*).

(Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

Ce médicament NE DOIT GENELEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, dans les situations suivantes :

- pendant la grossesse,

- en association avec l'amiodarone, le bépridil, le diltiazem et le vérapamil (médicaments pour le cœur).

(Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

MISES EN GARDE SPECIALES

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prévenir le médecin en cas de grossesse, allaitement, diabète, insuffisance rénale, certaines maladies des artères (syndrome de Raynaud).

Prévenir votre médecin en cas d'asthme en période de crise ou de bronchite chronique non équilibrée : suivre strictement l'avis de votre médecin.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, avertissez l'anesthésiste que vous prenez ce médicament.