

NOTICE**BRONCHOKOD® GÉ NOURRISSONS ET ENFANTS Sirop**
carbocistéine – 2 pour cent

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**Composition**

Carbocistéine 2 g

Excipient : saccharose, arôme caramel, parahydroxybenzoate de méthyle, hydroxyde de sodium, eau purifiée pour 100 ml.

Une cuillère-mesure de 5 ml contient 100 mg de carbocistéine.

Forme pharmaceutique et présentation

Sirop (Flacon de 125 ml avec cuillère-mesure).

Classe pharmaco-thérapeutique

Mucolytique

(R : Système Respiratoire)

Nom et adresse de l'exploitant

sanofi-aventis france

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris – France

Information médicale : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Nom et adresse du fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1-3, allée de la NESTE

Z.I. d'en Sigal

31770 Colomiers – France

ou

A. NATTERMANN & Cie GmbH

Nattermannallee 1

D-50829 Cologne – Allemagne

Ou

Pierre Fabre Médicament Production

SIMAPHAC

Zone industrielle

45220 Chateaufort - France

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un fluidifiant des sécrétions bronchiques et facilite ainsi leur évacuation par la toux.
Ce médicament est préconisé dans les états d'encombrement des bronches en particulier lors des bronchites aiguës.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans le cas suivant :

- antécédents d'allergie à l'un des constituants (notamment au parahydroxybenzoate de méthyle).
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

Mises en garde spéciales

Un avis médical est nécessaire :

- en cas d'expectoration grasse ou purulente,
- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons.

Ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par la carbocistéine.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, PREVENIR VOTRE MEDECIN.

En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenez compte dans la ration journalière de l'apport de 3,5 g de saccharose (sucre) par cuillère-mesure.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse – Allaitement

En cas de grossesse ou d'allaitement, PREVENIR VOTRE MEDECIN.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Saccharose (sucre) : 3,5 g par cuillère-mesure, parahydroxybenzoate de méthyle.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

Nourrissons de plus d'1 mois : la posologie est adaptée au poids du nourrisson : SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Nourrissons et enfants de 1 mois à 5 ans : ½ à 1 cuillère à café 1 à 2 fois par jour (soit 20 à 30 mg/kg/jour, répartis en 1 ou 2 prises sans dépasser 100 mg par prise), (1 cuillère à café = 5 ml).

Enfants de plus de 5 ans : une cuillère à café 3 fois par jour (soit 300 mg par jour, répartis en 3 prises).

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Durée du traitement

La durée du traitement doit être brève.

Ne pas dépasser 8 à 10 jours de traitement sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Possibilité de troubles digestifs : douleurs d'estomac, nausées, diarrhées. Il est alors conseillé de réduire la posologie.

Possibilité de réactions cutanées allergiques telles que urticaire, démangeaison, éruption cutanée, gonflement du visage (angio-œdème).

Quelques cas d'érythème pigmenté fixe (tache cutanée brune) ont été rapportés.

En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle, risque de réactions allergiques éventuellement retardées.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Décembre 2007.