

Virlix® 10 mg/ml

solution buvable en gouttes

dichlorhydrate de cétirizine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Dichlorhydrate de cétirizine1 g
Excipients : glycérol, propylène glycol, saccharine sodique, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, acétate de sodium, acide acétique glacial, eau purifiée q.s.p. 100 ml de solution buvable en gouttes.

Forme pharmaceutique et présentation

Solution buvable en gouttes. (Flacon de 15 ml).

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTI-HISTAMINIQUE H1

Exploitant

sanofi-aventis france
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris - France
Information médicale : N° vert 0800 222 555.
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1-3 allée de la Neste
31770 Colomiers - France

181052
89



DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un antihistaminique (il s'oppose aux effets de certaines substances telles que l'histamine libérées dans l'organisme au cours de l'allergie).

Il est préconisé :

Chez l'adulte pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex : rhume des foins) ou perannuelle,
- de l'urticaire,
- des conjonctivites d'origine allergique.

Chez l'enfant pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex : rhume des foins) ou perannuelle,
- de l'urticaire.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des composants de la solution buvable en gouttes ; à l'hydroxyzine, à la lévocétirizine ou à l'éthylène diamine,
- insuffisance rénale,
- enfants de moins de 2 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

La cétirizine doit être administrée avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.

Précautions particulières d'emploi

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUement TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Conducteurs et utilisateurs de machines

Chez certains patients, la cétirizine peut provoquer une somnolence. Cet effet est rare si la dose préconisée est respectée (voir "COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT"). Néanmoins, il est recommandé de s'assurer de l'absence de cet effet lors des premières prises avant de conduire ou d'utiliser des machines dangereuses.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

2 gouttes : 1 mg de dichlorhydrate de cétirizine.

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans :

- 20 gouttes 1 fois par jour.

Chez l'enfant de 6 à 12 ans :

- 10 gouttes 2 fois par jour, ou
- 20 gouttes 1 fois par jour.

Chez l'enfant de 2 à 6 ans :

- 5 gouttes 2 fois par jour, ou
- 10 gouttes 1 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

Consulter un médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Possibilité de troubles digestifs, bouche sèche, vertiges, maux de tête, augmentation du rythme cardiaque, fatigue, sensation de malaise.
- Des cas de réactions allergiques ont été décrits à type d'urticaire (rarement), d'œdème de Quincke (gonflement du visage et du cou) ou de choc anaphylactique (exceptionnellement).
- Exceptionnellement des cas de crises oculogyres et d'érythèmes pigmentés fixes ont été décrits.
- Possibilité de somnolence, chez certains sujets sensibles, apparaissant dès le début du traitement.
- Possibilité d'agitation particulièrement chez l'enfant.
- Modification du bilan hépatique réversible à l'arrêt du traitement.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Août 2006.